



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 4 du 29 février 2000 - 2 pages Numéro ordre postal : 008

Grandes Cultures

Colza

La reprise de végétation est plus ou moins amorcée selon les situations.

Régulateur

Dans les parcelles où cela est nécessaire (voir bulletin numéro 2), le régulateur PARLAY C peut s'employer de la reprise de végétation jusqu'au stade D2 (boutons accolés). La réduction de taille atteignant son maximum 2 à 4 semaines après le traitement, il est préférable d'intervenir à un stade jeune, en conditions poussantes.

Ravageurs

Malgré les conditions ensoleillées de ce week end, le démarrage du vol des ravageurs de printemps n'a pas été général. Des charançons de la tige du colza n'ont été piégés que dans quelques sites, notamment dans l'Essonne (voir carte). Les méligèthes sont déjà observés dans la moitié des postes de Seine et Marne et dans l'Est de l'Essonne.

Les conditions annoncées pour la semaine ne devraient guère favoriser les ravageurs. Une intervention insecticide est prématurée.

Rappels sur la nuisibilité :

Le charançon de la tige du colza peut provoquer, par ses piqûres de ponte, des éclatements de tige qui pourront pénaliser l'alimentation de la culture en cas de stress hydrique au printemps. Les méligèthes provoquent eux des dégâts directs sur les plantes, en perforant les boutons pour s'alimenter de pollen. Les petits boutons (moins de 3 mm) sont les plus exposés. Une arrivée précoce et massive est donc préjudiciable.

Blé

Piétin verse

Le graphique ci-joint illustre les courbes de risque piétin selon notre modèle de simulation à partir des données climatiques, pour des levées au 20 octobre. Le niveau est à ce jour du même niveau que celui de 99.

Rouille jaune

Les simulations que nous effectuons semblent indiquer un niveau de risque légèrement plus favorable que l'année passée, compte tenu de l'absence d'hiver et de la présence d'inoculum. L'année 1999 avait été marquée par le retour d'attaques importantes de la maladie dans le quart Nord-Ouest de la France, y compris sur des variétés présumées résistantes comme Baltimore, Cockpit, Brigadier, Tilburi..... Cela s'explique par le développement de races de rouille jaune présentant une virulence permettant de contourner un des gènes de résistance.

Il conviendra donc d'être vigilant de bonne heure cette année. Pour mémoire, en 1999, les premiers symptômes ont été observés dans la région vers le 9 avril, dans le Val d'Oise.

Fiches réglementation

Rappel des fiches déjà diffusées depuis octobre 1998. Si certaines vous manquent, nous pouvons vous les fournir sur simple demande (tél: 01-41-73-48-00 ou fax 01-41-73-48-48)

- agrément des distributeurs et applicateurs,
- stockage des produits phytos (1) : sensibilité au gel,
- stockage des produits phytos (2) : réglementation,
- stockage des produits phytos (3) : conseils pratiques,
- homologation des produits phytos : les usages,
- matières actives : interdictions, restrictions d'usage,
- l'homologation européenne,
- réglementation traitements aériens,
- transport des produits phytos : cas des agriculteurs.

Colza

Un peu de ravageurs.

Blé

Attention à la rouille jaune cette année.



L.O.

DS

Tg - 48744

P 76

Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Imprimé à la station
D'Avertissements
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
J. BOULUD

Publication périodique
C.P.A.P.
n°0904 B 00536
ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 360 F
Fax 435 F


CAPTURES DES CHARANCONS DU 23 AU 29 FEVRIER 2000



CAPTURES DES MELIGETHES DU 23 AU 29 FEVRIER 2000



Risque piétin-verse au 29 février



Adresses utiles

thermomètres, hygromètres, anémomètres
 société TESTO
 19 rue des maraîchers
 BP30100
 57602FORBACH
 tél: 03-87-29-29-00
 fax 03-87-29-29-18

grands jalons flexibles
 société MARKUS
 30 rue de mont de cats
 59270GODEWAERSVELDE
 tél: 03-28-42-55-00
 fax: 03-28-42-55-56